

## **INNERE MED3 Walldorf**

Bahnhofstrasse 1-3

Dr. med. Torsten Schröder

Arzt für Innere  
Medizin/Gastroenterologie

### **Medikamente:**

- Metformin bitte 48h vor der Untersuchung pausieren.
- Patienten mit insulinpflichtigem Diabetes mellitus können ihr Langzeitinsulin (z.B. Lantus®) unverändert weiternehmen.
- eine Einfachtherapie mit ASS oder Clopidogrel muss nicht pausiert werden. Werden mehrere Thrombozytenantiaggregationshemmer eingenommen, z.B. nach Koronarstentimplantation ist eine individuelle Risiko-Nutzenanalyse für die geplante Untersuchung erforderlich.
- Marcumar bitte ca. 4 Tage vor der Untersuchung pausiert werden. Der Quickwert sollte >50% betragen (INR<1,5).
- Niedermolekulare Heparine (NMH), z.B. Clexane® am Morgen des Untersuchungstags nicht applizieren.
- Neue orale Antikoagulanzen (NOACs), z.B. Xarelto®, Pradaxa®, Eliquis® je nach individuellem Risiko in der Regel 1 Tag, Pradaxa® 2 Tage vor der Untersuchung absetzen.
- die übrigen Medikamente können in der Regel unverändert am Morgen der Untersuchung mit einem Schluck Wasser eingenommen werden.